

Peste Suina Africana Focolaio Nel Selvatico

Cinghiale Sospetto

Analisi di prima istanza
CEREP

Tutti i suini selvatici
uccisi o rinvenuti morti
vengono analizzati

si informano i
proprietari di suini ed i
cacciatori

**Se Positivà
confermata**

Convocazione
gruppo di esperti

Zona infetta
-ACV
- Buffer
-AR

Confinamento dei suini allevati - isolamento da
contatto con selvatici

CU nelle aziende
suinicole, geolocalizzazione
e censimento di tutte le
categorie di suini presenti

Tutti i cinghiali trovati morti sottoposti ad ispezione da
parte del veterinario ufficiale.
Ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici
Gestione e smaltimento delle carcasse
Divieto di movimentazione di carne e derivati provenienti
da suini selvatici
Se CRAS intervengono su suini selvatici avvisare SV.

Delimitazione della zona infetta

macellazione immediata
a allevamenti bradi o semibradi o misti con
cinghiali- no ripopolamento per 6 mesi

macellazione suini
allevamenti familiari
e no ripopolamento per 6 mesi

programmazione macellazione tutti i suini presenti in allevamenti commerciali- no ripopolamento per 6 mesi

Controllo virologico
su tutti i suini
deceduti e casi
sospetti

trattamenti
terapeutici aziendali
necessari devono
essere autorizzati
ASL

Trascorsi 6 mesi ripopolamento possibile solo con ok check list biosicurezza class yfarm

Movimentazione da e verso la zona infetta vietate ad eccezione della macellazione